

Klinik for børn & unge



Montelukast



Forebyggende astma- og allergitabletter.

Singulair og Montelukast

Montelukast, som er det virksomme stof påvirker specielle receptorer i cellernes slimhinder, og virker forebyggende mod astma og allergi.

Det kan gives som behandling alene eller som supplement til andre astma midler.

Det virker ikke på alle børn med astma.

Det virker bedst på forkølelsesastma, anstrengelses astma og allergisk udløst astma.

Kan fåes som tyggetablet, granulat eller en almindelig tablet, der skal synkes.

Dosering:

Voksne og børn over 15 år: 10 mg ved sengetid.

Børn 6-14 år: 5 mg ved sengetid.

Børn 2-5 år: 4 mg ved sengetid.

Tyggetabletter bør tages mindst én time efter et måltid



Bør ikke anvendes

- Tyggetabletter må ikke anvendes ved Føllings sygdom.

Brug af andet medicin

- Det er vigtigt, at informere lægen om alle de lægemidler du tager.
- Epilepsimidler (phenytoin, Phenobarbital) og tuberkulosemiddel (Rifampicin) kan påvirke behandling med Montelukast.

Medicinen gives én gang dagligt og virker kun i 24 time og er herefter ude af kroppen igen.

Det er derfor vigtigt, at give det på ca. samme tidspunkt hver dag, og vi anbefaler om aftenen ved sengetid.

Hvis der anvendes Granulat, kan det strøes ud over maden, men må kun anvendes på tempereret mad, som ikke er for varmt.

Hvis det virker, hæmmer det betændelsestilstanden i luftrøret. Ofte er Montelukast særdeles effektiv mod forkølelsesastma.

Virkingen indtræder i løbet af timer. Er der ikke effekt efter 10-14 dage skal man stoppe med medicinen.

Bivirkning:

Vi ser enkelte gange, at børn får ondt i maven eller nedsat appetit. I sjældne tilfælde ændre børnene adfærd, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Stop straks behandlingen og kontakt klinikken.

Bivirkningerne vil forsvinde i løbet af 1 - 2 døgn.

